· 临床研究 ·

卡介苗联合白细胞介素 2 与丝裂霉素 C 预防膀胱癌术后复发的 Meta 分析

黄盛权¹, 叶刚¹, 廖钱金², 王祥卫¹, 吴清剑¹

(1. 第三军医大学新桥医院泌尿外科/全军肾脏病中心, 重庆 400037;

2. 重庆市沙坪坝区新桥社区卫生服务中心儿童保健科 400037)

摘要:目的 比较卡介苗(BCG)联合白细胞介素 2(IL-2)与丝裂霉素 C(MMC)膀胱灌注预防国内膀胱癌术后复发的效果。方法 检索国内已公开发表的关于 BCG 联合 IL-2 与 MMC 膀胱灌注治疗国人膀胱癌术后复发的比较性研究资料,采用 RevMan 4.2 软件对纳入研究的资料进行统计学综合(Meta 分析),采用优势比(OR)及其 95% 可信区间(95% CI)作为评价比较疗效的指标,并评估发表偏倚。结果 筛选后有 13 个文献纳入研究,涉及总病例数 611 例,其中进行 BCG 灌注治疗 312 例,MMC 治疗 299 例;在总的 13 组入选研究中,有 12 组研究显示 BCG 联合 IL-2 优于 MMC,有 1 组研究显示二者差异无统计学意义,Meta 分析结果提示 BCG 组预防膀胱癌术后复发作用统计学上优于 MMC 组(OR 0.32, 95% CI 0.2~0.5, P=0.000 01)。结论 BCG 联合 IL-2 膀胱灌注预防国人膀胱癌术后复发作用优于 MMC。

关键词:膀胱肿瘤;灌注治疗;卡介苗;白细胞介素-2;丝裂霉素;Meta 分析

doi:10.3969/j.issn.1671-8348.2012.20.017

文献标识码:A

文章编号:1671-8348(2012)20-2047-02

Meta analysis of bacillus Calmette-Guerin (BCG) combined with IL-2 and mitomycin C in the prevention of bladder cancer recurrence

Huang Shengquan¹, Ye Gang¹, Liao Qianjin², Wang Xiangwei¹, Wu Qingjian¹

(1. Department of Urology and Center of Nephrology, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400037, China; 2. Children's Health Care Division of Xinqiao Community Health Services Center, Shapingba District, Chongqing 400037, China)

Abstract: Objective We compare the therapeutic efficacy of intravesical bacillus Calmette-Guerin (BCG) combined with IL-2 and mitomycin C on recurrence after surgery of bladder carcinoma of Chinese. **Methods** Combined published and from comparative studies on BCG versus mitomycin C for bladder carcinoma after surgery considering possible confounding factors were analyzed by RevMan 4.2. Odds ratio (OR) and its 95% CI were used as primary effect size estimate. **Results** In 13 eligible clinical trials 312 patients were treated with BCG and 299 patients were treated with mitomycin C. In 12 of 13 studies BCG+IL-2 was significantly superior to mitomycin C, and in 1 study no significant difference was found. An overall statistically significant superiority of BCG + IL-2 versus mitomycin C efficacy in reducing tumor recurrence was detected (OR 0.32, 95% CI 0.2 to 0.5, P=0.000 01). **Conclusion** The results suggest BCG combined with IL-2 is superior to mitomycin C for prevention of tumor recurrences.

Key words: urinary bladder neoplasms; perfusion treatment; BCG vaccine; IL-2; mitomycin; meta-analysis

膀胱肿瘤是中国发病率最高的泌尿系统肿瘤。尽管大部分膀胱肿瘤可以通过手术得到治疗,然而膀胱癌的高复发率经常使病人感到沮丧。其中,膀胱内灌注是当前预防膀胱癌术后复发最常用的方法,膀胱内灌注主要药物有调节免疫药物和化疗药物,灌注的方法多种多样,有单独一种药物灌注,也有多种药物联合灌注或者不同药物序贯灌注,本文主要对国内应用卡介苗(BCG)联合白细胞介素-2(IL-2)灌注与丝裂霉素(MMC)灌注预防膀胱癌术后复发进行 Meta 分析。

1 材料与方 法

检索国内已发表的关于 BCG 联合 IL-2 与 MMC 膀胱灌注治疗预防膀胱癌复发的比较性研究资料,对获得的关于终点(复发率)为数据进行 Meta 分析;检索的数据库主要有中国生物文献数据库(CBMdisc)及 Google 学术,检索策略: #1BCG 联合 IL-2, #2MMC, #3 #1 and #2,检索年限为 2000~2010 年。并对获得的文献的参考文献进行扩大检索,然后根据标准从中选择研究。统计学处理采用 Cochrane 协作网提供的 Meta 分析软件 RevMan 4.2 进行。评价指标选用优势比(OR)及

其 95% 可信区间(CI)。研究筛选的标准:(1)国内正式刊物已公开发表的中文文献;(2)涉及 BCG 联合 IL-2 与 MMC 膀胱灌注预防膀胱癌复发的比较性研究,不论是否采用随机化及设盲的方法;(3)BCG 联合 IL-2 与 MMC 均为术后惟一辅助治疗,未接受其他可能影响终末事件的治疗;(4)参与者为膀胱癌患者,不考虑年龄及种族差异。

2 结 果

按纳入标准对检索到的研究进行选择,得到符合要求的 13 个研究^[1-13],根据 Cochrane 协作网的定义对研究质量进行评价,均为 B 级,即属队列研究、病例对照研究或随机化信息不全的随机对照研究。分别涉及 312 例行 BCG 联合 IL-2 治疗和 299 行 MMC 治疗,从以上研究中提取关于复发的数据,采用 RevMan 进行统计学处理,见图 1。

对纳入研究的关于复发的数据进行齐性检验, $P>0.05$, 即各研究的 OR 值齐性,提示研究间无异质性,因此选用固定效应模型(Peto 法)进行分析(表 1)。由表 1 可见,其中有 2 个研究优势比 OR 的 95% CI 小于 1(在 1 的左侧),具有统计学意

义,即认为 BCG 联合 IL-2 预防膀胱癌术后复发的疗效在统计学上优于 MMC;其余 11 个研究 OR 的 95% CI 跨过 1(位于 1 的两侧),即认为 BCG 与 MMC 的疗效差异无统计学意义。进行 Meta 分析汇总的结果提示 BCG 组 $OR=0.32, 95\%CI(0.2,$

$0.5)$ 在 1 的左侧,具有统计学意义($P=0.000\ 01$),表示 BCG 组复发率是 MMC 的 32%,即 BCG 组肿瘤复发风险比 MMC 降低 67%。

图 1 BCG 联合 IL-2 与 MMC 膀胱灌注预防膀胱癌术后复发的效果 Meta 分析

3 发表偏倚分析

从漏斗图可以看出存在偏倚,在没有偏倚的情况下,治疗效果估计值的准确性是随着研究样本量的增加而增加的,所以小样本研究的效应值应散在、广泛地分布在图形底部,而大样本研究的效应值相对集中地分布在图形中部或顶部,由于大样本研究的效应值分布随着样本量的增加而逐渐集中变窄,图形形状类似于一个倒置的对称的倒漏斗状;如果存在偏倚,比如阴性结果的研究未能发表,就会出现图形缺角,见图 2。

图 2 偏倚图

4 讨 论

对于膀胱癌的治疗,在外科手术术后辅以灌注化疗或灌注免疫治疗已获得共识,膀胱癌术后肿瘤复发率高达 70%^[14],而这些辅助治疗能够显著地降低肿瘤复发率。常见的术后辅助疗法包括免疫药物和化学药物膀胱内灌注,最常用的是 BCG 和 MMC,多数研究表明 BCG 预防膀胱癌术后复发效果更好,但同时具有更多的不良反应^[15]。BCG 膀胱内灌注的抗肿瘤机制,有人认为灌注 BCG 可引起 IL-2 的改变,IL-2 诱导的淋巴细胞对肿瘤具有特异性杀伤作用。IL-2 的肿瘤免疫原性尤为显著,由 T 淋巴细胞合成,刺激 T 细胞增殖转化成特异性细胞毒性 T 细胞,具有抗肿瘤效应。虽 BCG 已被公认是膀胱肿瘤

术后最有效的免疫治疗手段之一,但仍有不理想之处,许多研究认为联合应用 BCG 与 IL-2 膀胱内灌注,可以减少 BCG 并发症和增强免疫治疗效果^[16-17]。本文应用 Meta 分析方法对涉及 BCG 联合 IL-2 与 MMC 膀胱灌注预防膀胱癌复发的国内 13 组比较研究进行分析,从而了解 BCG 联合 IL-2 与 MMC 膀胱灌注预防膀胱癌复发的效果,如图 2 所示,在总的 13 个研究中,有 2 个研究^[6,9]显示 BCG 联合 IL-2 在统计学上优于 MMC,其他研究^[1-5,7,8,10-13]均显示二者没有统计学差异。本文对收集到的上述研究进行 Meta 分析,通过综合多个研究的结果、增大样本量来增加结论的把握度,解决上述研究结果的不一致性。通过分析表明,BCG 联合 IL-2 与 MMC 比较,可降低膀胱癌患者术后复发风险。

本研究不足之处首先为纳入国内的研究,多为非随机或随机化方法不当或随机化信息不全的研究,研究的方法学质量参差不齐,部分纳入研究方法学质量偏低,许多研究对随机化和分配隐藏的描述十分有限,使我们无法判断试验是否正确进行。如能获得设计良好的随机对照实验加入本研究进行 Meta 分析,则可提供更可靠、更为稳健的证据,更好地指导临床实践。

参考文献:

- [1] 方勇. 丝裂霉素 C、卡介苗、白细胞介素-2 膀胱灌注预防膀胱癌复发的疗效观察[J]. 工企医刊, 2001, 14(4): 6-7.
- [2] 葛宏, 葛长龙, 李忠善, 等. 5 种灌注药物预防膀胱癌术后复发的疗效观察[J]. 药物与临床, 2008, 5(2): 78.
- [3] 苟欣, 肖明朝, 尹志康. 卡介苗和白细胞介素-2 预防膀胱癌复发长期观察[J]. 医药导报, 2002, 21(9): 557-558.
- [4] 元建, 于洪刚. BCG 联合 IL-2 预防浅表性膀胱癌术后复发[J]. 山东医药, 2002, 42(18): 78-79.
- [5] 刘磊, 曹志华, 李鹏. 卡介苗加白介素-2 膀胱灌注防治浅表性膀胱肿瘤复发的研究[J]. 临床医学, 2005, 25(10): 10-11.

中认知功能的作用^[9]。其分子机制涉及增加脑源性神经生长因子和胰岛素样生长因子-1 的表达,减少氧化应激相关基因的表达,诱导神经可塑性相关转录因子等。还有研究还发现锻炼有抗炎作用^[10]。而炎症也介导了 PD 的发病^[11]。这些发现提示锻炼可能具有改善 PD 患者 NMS 的作用。本研究发现,农村和城市 PD 患者的 NMS 发生都非常普遍,但农村 PD 患者 NMS 得分相对较低,记忆力下降也较农村 PD 患者轻。这可能与农村 PD 患者从事体力劳动相对较多有关。

此外,本研究 PD 患者出现的 NMS 中,除记忆减退外,城市患者的注意力不集中、焦虑、抑郁、恐惧、幻觉等高级皮层功能受损症状的比例也比农村患者高,但无统计学差异,这可能与其所处的环境、思考问题方式等不同有关。

综上所述,PD 的运动症状和 NMS 都严重影响着患者的生活质量,但农村和城市 PD 患者的运动症状和 NMS 各有其特点。因此,临床医生在治疗农村和城市 PD 患者时,应全面正确地认识他们运动症状和 NMS 的各自特点,进行个体化的治疗,以更好地提高 PD 患者的生活质量。

参考文献:

- [1] Chaudhuri KR, Healy DG, Schapira AH. Non motor symptoms of Parkinson's disease: diagnosis and management [J]. *Lancet Neurol*, 2006, 5(3): 235-245.
- [2] Chaudhuri KR, Martinez-Martin P, Schapira AH, et al. International multicenter pilot study of the first comprehensive self-completed nonmotor symptoms questionnaire for Parkinson's disease: the NMSQuest study [J]. *Mov Disord*, 2006, 21(7): 916-923.
- [3] Wirdefeldt K, Adami HO, Cole P, et al. Epidemiology and

etiology of Parkinson's disease: a review of the evidence [J]. *Eur J Epidemiol*, 2011, 26 Suppl 1: S1-58.

- [4] Cannon JR, Greenamyre JT. Neurotoxic in vivo models of Parkinson's disease recent advances [J]. *Prog Brain Res*, 2010, 184: 17-33.
- [5] Nisticò R, Mehdawy B, Piccirilli S, et al. Paraquat- and rotenone-induced models of Parkinson's disease [J]. *Int J Immunopathol Pharmacol*, 2011, 24(2): 313-322.
- [6] Tanner CM, Kamel F, Ross GW, et al. Rotenone, paraquat, and Parkinson's disease [J]. *Environ Health Perspect*, 2011, 119(6): 866-872.
- [7] Bernal-Pacheco O, Limotai N, Go CL, et al. Nonmotor manifestations in Parkinson disease [J]. *Neurologist*, 2012, 18(1): 1-16.
- [8] Braak H, Del Tredici K, Rub U, et al. Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease [J]. *Neurobiol Aging*, 2003, 24(2): 197-211.
- [9] Ahlskog JE. Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in Parkinson disease [J]. *Neurology*, 2011, 77(3): 288-194.
- [10] Petersen AM, Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise [J]. *J Appl Physiol*, 2005, 98(4): 1154-1162.
- [11] Qian L, Flood PM, Hong JS, et al. Neuroinflammation is a key player in Parkinson's disease and a prime target for therapy [J]. *J Neural Transm*, 2010, 117(8): 971-979.

(收稿日期: 2011-12-09 修回日期: 2012-04-26)

(上接第 2048 页)

- [6] 毛志森, 党永辉. 膀胱肿瘤术后药物灌注预防复发的临床分析 [J]. *中华实用医学*, 2002, 4(21): 44-45.
- [7] 秦自科, 梅骅, 戴宇平, 等. BCG-CWS 联合 IL-2 预防浅表性膀胱癌术后复发 [J]. *中华泌尿外科杂志*, 2001, 22(1): 38-39.
- [8] 孙文洪, 杨建敏, 杨立新, 等. 卡介苗与白介素-2 联合应用预防浅表性膀胱癌复发疗效观察 [J]. *中原医学*, 2003, 30(23): 1-2.
- [9] 王娟. 药物灌注化疗预防膀胱癌术后复发的临床观察 [J]. *实用肿瘤杂志*, 2005, 19(1): 12-13.
- [10] 王绪雷, 郝俊文, 沈戈桢, 等. 卡介苗联合白细胞介素-2 防治膀胱癌术后复发 [J]. *医药导报*, 2002, 21(9): 549-550.
- [11] 王志清. 膀胱癌术后膀胱灌注药物的临床观察 [J]. *护理研究*, 2007, 21(24): 2200-2201.
- [12] 曾翔. 药物膀胱内灌注预防浅表性膀胱癌术后复发疗效比较 [J]. *中国健康月刊*, 2010, 9(13): 1.
- [13] 赵勇, 康红梅, 卢丽英. 三种灌注药物预防膀胱癌术后复发的疗效观察 [J]. *临床泌尿外科杂志*, 2000, 15(6): 251-252.
- [14] Böhle A, Jocham D, Bock PR. Intravesical bacillus Calmette-Guerin versus mitomycin C for superficial bladder cancer:

a formal meta-analysis of comparative studies on recurrence and toxicity [J]. *J Urol*, 2003, 169(1): 90-95.

- [15] Witjes JA, v d Meijden AP, Collette L, et al. Long-term follow-up of an EORTC randomized prospective trial comparing intravesical bacille Calmette-Guérin-RIVM and mitomycin C in superficial bladder cancer. EORTC GU Group and the Dutch South East Cooperative Urological Group. European Organisation for Research and Treatment of Cancer Genito-Urinary Tract Cancer Collaborative Group [J]. *Urology*, 1998, 52(3): 403-410.
- [16] Bunimovich-Mendrazitsky S, Claude Gluckman J, Chaskalovic J. A mathematical model of combined bacillus Calmette-Guerin (BCG) and interleukin (IL)-2 immunotherapy of superficial bladder cancer [J]. *J Theor Biol*, 2011, 277(1): 27-40.
- [17] Huang X, Yu HS, Chen Z, et al. A novel immunotherapy for superficial bladder cancer by the immobilization of streptavidin-tagged bioactive IL-2 on the biotinylated mucosal surface of the bladder wall [J]. *Chin J Cancer*, 2010, 29(6): 611-616.

(收稿日期: 2011-12-09 修回日期: 2012-01-29)